



แนวทางการบริหารยา

FUROSEMIDE

INJECTION



Usual Infusion Concentration

IV Infusion : 1mg/ml หรือ 2mg/ml

Undiluted : 10mg/ml

RATE

IV infusion Rate : < 4 mg/min

Undiluted direct IV Rate : 20-40 mg/min

(เช่น Order 40mg IV ต้องให้ในเวลาอย่างน้อย 2 นาที)

สารละลายที่ใช้ได้

NSS,D5S, D5W,D10W,
RINGER, 3% NaCl

กรณีไม่ Dilute

หากน้อยกว่า 80 mg สามารถให้ **Direct IV** ได้ โดยไม่ต้อง Dilute

หากมากกว่า 80 mg ให้ใช้ Infusion pump เพื่อป้องกัน Ototoxicity โดยใช้ Rate ไม่เกิน 2.5 ml/hr

1 Gm IV drip in 24 hr. (Undiluted)

- Drain น้ำใน ขวด Nss 100 ml ทิ้งจากนั้นแทนที่ด้วย Furosemide 250mg/25ml จำนวน 4 vials โดยไม่ต้อง Diluted ใช้ Infusion pump rate ≤ 4 mg/min

กรณี Dilute (แพทย์กำหนด Total volume)

- ตั้งแต่ 80 mg - 250 mg

ให้ใช้ Furosemide ปริมาณเป็น ml ผสมใน

Nss จนถึง 50 ถึง 100 ml drip ≤ 4 ml/min

- หากให้ยา 120 mg drip > 30 min
- หากให้ยา 130-250 mg drip > 60 min
- ตั้งแต่ 260 mg - 500 mg

ให้ใช้ Furosemide เป็น ml ผสมใน Nss จนถึง 100 ml

- หากให้ยา 260-360 mg drip > 90 min
- หากให้ยา 370-500 mg drip > 120 min

